

# Infección de tuberculosis Latente

Estoy sano.

Los gérmenes de la tuberculosis están dormidos en mi cuerpo, pero podrían despertar en el futuro.

No tengo síntomas.

Mi radiografía de pecho es normal.

No soy contagioso.

Tengo un resultado positivo en la prueba de tuberculosis en piel o en sangre.

# Enfermedad de tuberculosis Activa

Tengo una enfermedad grave que puede matarme si no la trato.



Los gérmenes de la tuberculosis han despertado.

Puedo tener síntomas - tos, fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos.

Mi radiografía de pecho es anormal.

Puedo ser contagioso y puedo infectar otras personas cuando los gérmenes de tuberculosis se diseminan por el aire cuando toso, me río, o hablo.

Puedo tener un resultado positivo en la prueba de mi flema.



¿Puede mi **Infección de tuberculosis Latente** (gérmenes dormidos) despertar y enfermarme con la **tuberculosis Activa**?

Sí, y ¡Ciertos factores aumentan el riesgo!

- Llegué recientemente de otro país donde la tuberculosis es común.
- Tengo VIH.
- He estado recientemente en contacto cercano con alguien que tiene la enfermedad de tuberculosis activa.
- Tengo diabetes, insuficiencia renal, o cáncer.
- Tuve cirugía para quitar una parte de mi estómago.
- Vivo o trabajo en un hospital, cárcel, centro de rehabilitación de drogas, o alberge para indigentes.
- Uso drogas inyectables ilegales.
- Recibí un trasplante de órgano.
- Uso ciertas medicinas que afectan mi sistema inmune, como prednisona (esteroides), u otros medicamentos para tratar ciertas condiciones en la piel, articulaciones o gastrointestinales.

Si tengo la **Infección de tuberculosis Latente** ¿puedo reducir mis riesgos de enfermarme con la **tuberculosis Activa**?

## ¡Sí, puedo prevenir la tuberculosis!

Puedo tomar medicamentos seguros y efectivos.

