

# 潜伏性

### 结核杆菌感染

我很健康。

## 活动性

### 结核病

我的病非常严重,如果不及时治疗可能会致死。

结核杆菌在我的体内"休眠", 但可能某天就会"苏醒"。 我体内的结核杆菌已经"苏醒"。

我没有出现任何症状。

我出现了咳嗽、发热、体重减轻、 盗汗的症状。

我的胸部 X 光检查结果正常。

我的胸部 X 光检查结果异常。

我不具传染性。

我具有传染性, 当我咳嗽、大笑或说话时, 我可能会将结核杆菌通过空气散播出去, 传染给他人。

我的结核病皮肤试验或验血结果 呈阳性。

我的痰结核菌检查结果 呈阳性。

我的潜伏性结核杆菌感染("休眠"的病菌)会"苏醒"并使我患上活动性结核病吗?

#### 是,某些因素会增加我的风险!

- 我近期去过结核病多发的国家。
- 我患有艾滋病。
- 我与活动性结核病患者有过密切接触。
- 我患有糖尿病、肾衰竭或癌症。
- 我做过胃切除手术。
- 我在医院、监狱、戒毒所或收容所生活或工作。
- 我正在使用注射类药物。
- 我做过器官移植手术。
- 我正在服用某些会影响免疫系统的药物来治疗某种皮肤、关节或胃肠道疾病,例如泼尼松(类固醇)或其他口服药或注射剂。

如果我患有潜伏性结核杆菌感染,我能否降低

其恶化为活动性结核病的风险?

## 能,我可以预防结核病!

我可以服用安全有效的药物。














Can my Latent TB Infection (sleeping germs) wake up and make me sick with **Active TB Disease?** 

#### Yes, and certain factors increase my risk!

- I arrived recently from another country where TB is common.
- I was in close contact with someone with active TB disease.
- I have diabetes, kidney failure, or cancer.
- I had surgery to remove part of my stomach.
- I live or work in a hospital, jail, drug rehab center or shelter.
- I use injection drugs.
- I have received an organ transplant.
- I take certain medications that affect my immune system, like prednisone (steroids) or other pills or injections to treat certain types of skin, joint and gastrointestinal conditions.

If I have Latent TB Infection, can I reduce my chances of getting sick with Active TB Disease?

## Yes, I can prevent tuberculosis!

I can take safe, effective medicines.





