

Ang Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Iyong Gamot para sa Latent Tuberculosis (TB) Infection

ISONIAZID at RIFAPENTINE

Binigyan ka ng gamot upang malunasan ang latent TB infection mo. Wala kang sakit na TB at hindi ka makakahawa ng TB sa iba. Matutulungan ka ng gamot na ito na **MAPIGILAN** ang pagkakaroon ng aktibong sakit na TB.

Tandaang Dumalo sa Iyong mga Lingguhang Pagpapatingin:

Magpapatingin ka sa isang health care worker linggu-linggo upang makuha ang iyong mga gamot. Ang planong ito ay tinatawag na directly observed therapy (DOT).

Matutulungan ka ng DOT sa maraming paraan.

- Tinutulungan ka ng health care worker na maalala mong inumin ang iyong mga gamot.
- Tatapusin mo ang iyong paggamot sa lalong madaling panahon.
- Titiyakin ng health care worker na hindi ka nagkakaroon ng mga problema sa mga gamot.
- Sa iyong mga lingguhang pagpapatingin, masasagot ng taong ito ang mga tanong mo. Maaari mo ring sabihin ang anumang saloobin mo.

Habang iniinom ang Gamot na ito:

- ✓ Ipaalam sa iyong doktor o nurse kung mayroon kang mga tanong o saloobin sa gamot.
- ✓ Pumunta sa mga lingguhang pagpapatingin.
- ✓ Talakayin ang anumang pag-inom ng alak sa iyong doktor. Maaaring magdulot ng mga side effect ang pag-inom ng alak.
- ✓ Ipaalam sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang gamot na iniinom mo.
- ✓ Tiyaking sabihin sa iba mo pang doktor na sumasailalim ka sa paggamot para sa latent TB infection.
- ✓ Sa ilang tao, mas nagiging mahina ang pangit na epekto ng mga gamot kapag iniinom nang may laman ang tiyan.

Iskedyul ng Gamot para sa Latent TB Infection:

(Mga Provider: Ilagay ang naaangkop na araw at dami ng tableta)

Gamot	Iskedyul	Araw	Dami ng pill kada araw	Haba ng oras
Isoniazid at Rifapentine	Isang beses kada linggo	M T W Th F S Sun		3 buwan (12 linggo)

Maaaring ibilin ng iyong doktor na uminom ng vitamin B6 kasabay ng gamot mo.

TANDAAN

Pangalan ng aking doktor:
Pangalan ng aking klinika:
Numero ng telepono ng aking klinika:



Bantayan ang Mga Posibleng Problemang Ito:

TUMIGIL AT tawagan kaagad ang iyong doktor o nurse sa TB kung mayroon ka ng alinman sa mga problema sa ibaba:

- Hindi gaanong magana o nawalan ng gana sa pagkain
- Masakit o pinupulikat na tiyan
- Lagnat
- Pananakit ng ulo o katawan
- Pagduruwal o pagsusuka
- Mala-tsa na ihi o aputlang dumi
- Madaling magpasa o magdugo
- Pamamantal o pangangati
- Paninilaw ng balat o mga mata
- Matinding panghihina o pagod
- Pakiramdam ng tumutusuk-tusok o pamamanhid sa iyong mga kamay o paa
- Pagkahilo

TANDAAN: Normal lang na manilaw ang iyong ihi, laway, o luha. Maaaring mag-iba ang kulay ng malalambot na contact lens.

What You Need to Know About Your Medicine for Latent Tuberculosis (TB) Infection

ISONIAZID and RIFAPENTINE

You have been given medicine to treat your latent TB infection. You do not have TB disease and cannot spread TB to others. This medicine will help you **PREVENT** getting TB disease.

Remember to Keep Your Weekly Visits:

You will meet with a health care worker weekly to take your medicines. This plan is called directly observed therapy (DOT).

DOT can help you in several ways.

- The health care worker helps you to remember to take your medicines.
- You will complete your treatment as soon as possible.
- The health care worker will make sure you are not having problems with the medicines.
- During your weekly meetings, this person can answer your questions. You can also talk about any concerns you have.

While on this Medicine:

- ✓ Tell your doctor or nurse if you have questions or concerns with the medicine.
- ✓ Go to weekly visits.
- ✓ Discuss any alcohol use with your doctor. Alcohol use may cause side effects.
- ✓ Tell your doctor about all other medicines you are taking.
- ✓ Be sure to tell your other doctors that you are being treated for latent TB infection.
- ✓ Some people find that the medicines affect them less when taken with food.

Latent TB Infection Medicine Schedule:

(Providers: Indicate the appropriate day and number of pills)

Medicine	Schedule	Day	Number of pills per day	Length of time
Isoniazid & Rifapentine	Once weekly	M T W Th F S Sun		3 months (12 weeks)

Your doctor may have you take vitamin B6 with your medicine.

NOTES

Name of my doctor:

Name of my clinic:

Telephone number of my clinic:



Watch for these Possible Problems:

STOP AND call your TB doctor or nurse right away if you have any of the problems below:

- Less appetite, or no appetite for food
- An upset stomach or stomach cramps
- Fever
- Head or body aches
- Nausea or vomiting
- Cola-colored urine or light stools
- Easy bruising or bleeding
- Rash or itching
- Yellowing skin or eyes
- Severe weakness or tiredness
- Tingling or numbness in your hands or feet
- Dizziness

NOTE: It is normal if your urine, saliva, or tears become orange-colored. Soft contact lenses may become stained.