

ما الذي تحتاج إلى معرفته عن دوائك الخاص بعدوى السل الكامنة

الريفامبين

لقد أعطيت دواءً لعلاج عدوى السل الكامنة لديك. لست مصابًا بالسل ولا يمكن أن تنتشره إلى الآخرين. ولكن هذا الدواء سيساعدك على الوقاية من الإصابة بمرض السل.

خلال فترة تناولك الدواء:

- أخبر طبيبك أو ممرضك إن كانت لديك استفسارات أو مخاوف تتصل بهذا الدواء.
- التزم بزياراتك المحددة إلى العيادة.
- ناقش أي تعاطٍ للكحول مع طبيبك. فتعاطي الكحول قد يسبب آثارًا جانبية.
- أخبر طبيبك عن كل الأدوية الأخرى التي تتناولها.
- احرص على إخبار أطباءك الآخرين بأنك تُعالج من عدوى السل الكامنة.
- تناول دواءك كله على النحو الذي أخبرك به طبيب السل أو الممرض.
- يشعر بعض الأشخاص بأن وطأة الدواء عليهم تكون أقل عندما يأخذونه مع الطعام.

نصائح لمساعدتك في تناول دوائك:

- ✓ تناول دواءك في الوقت نفسه كل يوم.
- ✓ اضبط منبهًا على الوقت الذي يتعين عليك فيه تناول دوائك.
- ✓ اطلب من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء تذكيرك.
- ✓ استخدم علبة لأقراص الدواء.
- ✓ ضع ملاحظةً للتذكير على المرأة أو البراد.
- ✓ استخدم تقويمًا لشطب اليوم الذي تناولت فيه دواءك.

جدول مواعيد أدوية عدوى السل الكامنة:

(المقدمون: حدّد العدد الملائم من الأقراص)

الأدوية	جدول مواعيد	عدد الأقراص في اليوم	المدة الزمنية
الريفامبين	يوميًا		4 أشهر

ربما يطلب منك طبيبك الالتقاء بعامل في الرعاية الصحية لتتناول دواءك. يطلق على هذه الخطة اسم العلاج تحت المراقبة المباشرة (DOT).

إذا نسيت تناول دوائك: إذا كنت لا تزال في اليوم نفسه، فخذ الجرعة حالما تتذكر. لا تأخذ جرعتين في الوقت نفسه.

ملحوظة

اسم طبيبي:
اسم عيادتي:
رقم هاتف عيادتي:

توقف

انتبه إلى المشاكل المحتملة التالية:

توقف عن أخذ الدواء على الفور واتصل بطبيب السل أو الممرض على الفور إذا عانيت من أي من المشاكل التالية:

- انخفاض الشهية للطعام أو انعدامها
- اضطراب المعدة أو تشنجه
- الغثيان أو القيء
- البول الغامق أو البراز الفاتح
- سهولة الإصابة بالرضوض أو النزيف
- الطفح الجلدي أو الحكة
- اصفرار الوجه أو العينين
- الضعف أو التعب الشديد
- الحمى
- الصداع أو الآلام في الجسم
- الدوار

ملحوظة: من الطبيعي أن يتلون البول أو اللعاب أو الدموع باللون البرتقالي. يمكن أن يتغير لون العدسات اللاصقة.