

# Nhiễm trùng Lao Tiềm ẩn

Tôi khỏe mạnh.

Vi trùng Lao đang “ngủ” trong cơ thể tôi nhưng có thể “tỉnh giấc” trong tương lai.

Tôi không có triệu chứng gì.

Ảnh chụp x-quang ngực của tôi là bình thường.

Tôi không dễ lây bệnh cho người khác.

Tôi có kết quả dương tính với xét nghiệm Lao qua da hay xét nghiệm máu.

# Bệnh Lao Hoạt tính

Tôi mắc một căn bệnh nghiêm trọng mà có thể bị tử vong nếu không được điều trị.

Vi trùng Lao đã “thức dậy”.

Tôi có thể có các triệu chứng — ho, sốt, sụt cân, toát mồ hôi về đêm.

Ảnh chụp x-quang ngực của tôi có thể không bình thường.

Tôi có thể dễ lây nhiễm bệnh cho người khác khi vi trùng Lao được truyền qua không khí khi tôi ho, cười hay nói.

Tôi có thể có kết quả dương tính trong các xét nghiệm đờm.

Liệu **Nhiễm Trùng Lao Tiềm ẩn** (vi trùng ở trạng thái ngủ) có thức dậy và khiến tôi bị **Bệnh Lao Hoạt tính** không?

**Có, và các yếu tố nhất định làm tăng nguy cơ của tôi!**

- Tôi mới tới từ một quốc gia khác nơi mà bệnh lao là phổ biến.
- Tôi mắc HIV.
- Tôi đã tiếp xúc gần gũi với một người mắc bệnh lao hoạt tính.
- Tôi bị tiểu đường, suy thận, hoặc ung thư.
- Tôi đã trải qua phẫu thuật để cắt bỏ một phần dạ dày.
- Tôi sống hoặc làm việc trong một bệnh viện, nhà giam, trung tâm cai nghiện ma túy hay một trung tâm trú ẩn.
- Tôi tiêm chích ma túy.
- Tôi đã được cấy ghép nội tạng.
- Tôi dùng các loại thuốc nhất định ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của tôi, như prednisone (steroids) hay các loại thuốc viên hay thuốc tiêm khác để điều trị các tình trạng bệnh lý nhất định về da, khớp và dạ dày-ruột.

Nếu tôi bị **Nhiễm Trùng Lao Tiềm ẩn**, tôi có thể giảm nguy cơ bị ốm do **bệnh Lao Hoạt tính** không?

## Có, tôi có thể ngăn ngừa bệnh Lao!

Tôi có thể dùng các loại thuốc an toàn, hiệu quả.

